

Soluzione contenete cannabidiolo (CBD) 2,5 % (m/m)

Questo preparato non contiene THC (tetraidrocannabinolo) e non sottostà alla legislazione sugli stupefacenti. Può essere prescritto mediante normale ricetta medica per i casi di epilessia. Per altre indicazioni occorre presentare alla farmacia una documentazione scritta, nella quale figurino anche le ragioni per le quali si intende avviare una terapia a base di CBD.

Confezioni / Prezzi

Flaconcini Aponorm marroni con imboccatura standard contagocce

20 g (corrispondono a 500 mg CBD) 80.00 fr. 1 mg costa ca. -.16 fr.
50 g (corrispondono a 1250 mg CBD) 200.00 fr. 1 mg costa ca. -.15 fr.

Costi giornalieri della terapia

Dose giornaliera 10 mg 1.60 fr.
Dose giornaliera 25 mg 4.00 fr.
Dose giornaliera 50 mg 8.00 fr.
Dose giornaliera 100 mg 16.00 fr.

36 gocce corrispondono a ca. 1,0 g di soluzione di CBD 2,5 %
720 gocce corrispondono a ca. 20,0 g di soluzione CBD 2,5 %
1800 gocce corrispondono a ca. 50,0 g di soluzione CBD 2,5 %

<u>Tabella di conversione</u> (corrispondenza tra numero di gocce e mg di CBD)
Attenzione: misurazione con contagocce standard
1 goccia corrisponde a ca. \approx 0,7 mg CBD
3-4 gocce corrispondono a ca. \approx 2,5 mg CBD
14 gocce corrispondono a ca. \approx 10,0 mg CBD
28 gocce corrispondono a ca. \approx 20,0 mg CBD
36 gocce (= 1 g soluzione) corrispondono a \approx 25,0 mg CBD
Posologia in ml: 1 ml (= ca. 1 g = 36 gocce) \approx 25 mg CBD
Densità della soluzione 2,5 %: ca. 0,95 g/cm ³ → per la precisione del dosaggio (con siringa da 1 ml) la densità è trascurabile

Posologia

La posologia è individuale e viene stabilita dal medico. L'intervallo terapeutico è molto largo. In studi effettuati su persone adulte, sono state somministrate dosi quotidiane comprese tra 10 e 1000 mg di CBD. Negli studi su bambini con epilessia, sono stati somministrati 2-5 mg (fino a un massimo di 25 o 50 mg) di CBD per kg di peso (suddivisi tra più somministrazioni)*.

*Devinsky O. et al. Lancet Neurol. 2016 Mar;15(3):270-8; Hess E. J. et al. Epilepsia 2016 Oct;57(10):1617-24

Assunzione

Le gocce sono oleose e vanno di preferenza assunte assieme ad alimenti grassi (ad es. con un po' di olio da tavola, yogurt, latte o su un biscotto al burro).

Conservazione

Data di scadenza: 6 mesi dalla data di fabbricazione. La soluzione va conservata a temperatura ambiente. L'olio veicolante è un olio neutrale (Miglyol 812), al quale è stato palmitato di ascorbilo (0,05 %), un conservante naturale.

Soluzione contenente cannabidiolo (CBD) 5,0 % (m/m)

Questo preparato non contiene THC (tetraidrocannabinolo) e non sottostà alla legislazione sugli stupefacenti. Può essere prescritto mediante normale ricetta medica per i casi di epilessia. Per altre indicazioni occorre presentare alla farmacia una documentazione scritta, nella quale figurino anche le ragioni per le quali si intende avviare una terapia a base di CBD.

Confezioni / Prezzi

Flaconcini Aponorm marroni con imboccatura standard contagocce

20 g	(corrispondono a 1000 mg CBD)	160.00 fr.	1 mg costa ca. -.16 fr.
50 g	(corrispondono a 2500 mg CBD)	380.00 fr.	1 mg costa ca. -.15 fr.

Costi giornalieri della terapia (flaconcini da 20g)

Dose giornaliera	10 mg	1.60 fr.
Dose giornaliera	25 mg	4.00 fr.
Dose giornaliera	50 mg	8.00 fr.
Dose giornaliera	100 mg	16.00 fr.

36 gocce corrispondono a ca. 1,0 g di soluzione di CBD 5,0 %

720 gocce corrispondono a ca. 20,0 g di soluzione CBD 5,0 %

1800 gocce corrispondono a ca. 50,0 g di soluzione CBD 5,0 %

Tabella di conversione (corrispondenza tra numero di gocce e mg di CBD)
Attenzione: misurazione con contagocce standard
1 goccia corrisponde a ca. \approx 1,4 mg CBD
3-4 gocce corrispondono a ca. \approx 5,0 mg CBD
7 gocce corrispondono a ca. \approx 10,0 mg CBD
18 gocce corrispondono a ca. \approx 25,0 mg CBD
36 gocce (= 1 g di soluzione) corrispondono a \approx 50,0 mg CBD
Posologia in ml: 1 ml (= ca. 1 g = 36 gocce) \approx 50 mg CBD
Densità della soluzione 5,0 %: ca. $0,95 \text{ g/cm}^3 \rightarrow$ per la precisione del dosaggio (con siringa da 1 ml) la densità è trascurabile

Posologia

La posologia è individuale e viene stabilita dal medico. L'intervallo terapeutico è molto largo. In studi effettuati su persone adulte, sono state somministrate dosi quotidiane comprese tra 10 e 1000 mg di CBD. Negli studi su bambini con epilessia, sono stati somministrati 2–5 mg (fino a un massimo di 25 o 50 mg) di CBD per kg di peso (suddivisi tra più somministrazioni)*.

*Devinsky O. et al. Lancet Neurol. 2016 Mar;15(3):270-8; Hess E. J. et al. Epilepsia 2016 Oct;57(10):1617-24

Assunzione

Le gocce sono oleose e vanno di preferenza assunte assieme ad alimenti grassi (ad es. con un po' di olio da tavola, yogurt, latte o su un biscotto al burro).

Conservazione

Data di scadenza: 6 mesi dalla data di fabbricazione. La soluzione va conservata a temperatura ambiente. L'olio veicolante è un olio neutrale (Miglyol 812), al quale è stato aggiunto palmitato di ascorbile (0,05 %), un conservante naturale.

Soluzione contenente cannabidiolo (CBD) 10,0 % (m/m)

Questo preparato non contiene THC (tetraidrocannabinolo) e non sottostà alla legislazione sugli stupefacenti. Può essere prescritto mediante normale ricetta medica per i casi di epilessia. Per altre indicazioni occorre presentare alla farmacia una documentazione scritta, nella quale figurino anche le ragioni per le quali si intende avviare una terapia a base di CBD.

Confezioni / Prezzi

Flaconcini Aponorm marroni con imboccatura standard contagocce

10 g	(corrispondono a 1000 mg CBD)	160.00 fr.	1 mg costa ca. -.16 fr.
20 g	(corrispondono a 2000 mg CBD)	320.00 fr.	1 mg costa ca. -.16 fr.
50 g	(corrispondono a 5000 mg CBD)	720.00 fr.	1 mg costa ca. -.15 fr.

Costi giornalieri della terapia (flaconcini da 20g)

Dose giornaliera	10 mg	1.60 fr.
Dose giornaliera	25 mg	4.00 fr.
Dose giornaliera	50 mg	8.00 fr.
Dose giornaliera	100 mg	16.00 fr.

36 gocce corrispondono a ca. 1,0 g di soluzione di CBD 10,0 %

720 gocce corrispondono a ca. 20,0 g di soluzione CBD 10,0 %

1800 gocce corrispondono a ca. 50,0 g di soluzione CBD 10,0 %

<u>Tabella di conversione</u> (corrispondenza tra numero di gocce e mg di CBD)
Attenzione: misurazione con contagocce standard
1 goccia corrisponde a ca. \approx 2,8 mg CBD
3-4 gocce corrispondono a ca. \approx 10,00 mg CBD
9 gocce corrispondono a ca. \approx 25,0 mg CBD
18 gocce corrispondono a ca. \approx 50,0 mg CBD
36 gocce (= 1 g di soluzione) corrispondono a \approx 100,0 mg CBD
Posologia in ml: 1 ml (= ca. 1 g = 36 gocce) \approx 100 mg CBD
Densità della soluzione di CBD 10,00 %: ca. 0,95 g/cm ³ → per la precisione del dosaggio (con siringa da 1 ml) la densità è trascurabile

Posologia

La posologia è individuale e viene stabilita dal medico. L'intervallo terapeutico è molto largo. In studi effettuati su persone adulte, sono state somministrate dosi quotidiane comprese tra 10 e 1000 mg di CBD. Negli studi su bambini con epilessia, sono stati somministrati 2-5 mg (fino a un massimo di 25 o 50 mg) di CBD per kg di peso (suddivisi tra più somministrazioni)*.

*Devinsky O. et al. Lancet Neurol. 2016 Mar;15(3):270-8; Hess E. J. et al. Epilepsia 2016 Oct;57(10):1617-24

Assunzione

Le gocce sono oleose e vanno di preferenza assunte assieme ad alimenti grassi (ad es. con un po' di olio da tavola, yogurt, latte o su un biscotto al burro).

Conservazione

Data di scadenza: 6 mesi dalla data di fabbricazione. La soluzione va conservata a temperatura ambiente. L'olio veicolante è un olio neutrale (Miglyol 812), al quale è stato aggiunto palmitato di ascorbile (0,05 %), un conservante naturale.